			品薬忌禁	
		業準 宗		
В	/ 0		容内敷於の薬	
В	/ 0		な中部なん変	
В	/ 0	薬野普開ラ		
			の針のチ ーキ1/ファ	
			くやハノト	
			状金の (鬼金重)	
ぜん息カード				
な	まえ		血液型	
生年月日				
緊	緊急時の連絡先			

なまえ 皿液型 生年月日 月 緊急時の連絡先 (続柄 なまえ (続柄 かかりつけ医 なまえ 施設名 事絡先

アクションプランシート ぜん息個別対応プラン

吸入薬: を1回 吸入を1日 回。			
内服薬: を毎日続けましょう。 風邪のひきははめ 悪化因子に近づき、発作が起きそうだと感じたとき お薬の連加/変更しましょう。 吸入薬: を1回 吸入を1日 回。 内服薬: 。 貼り薬: 。			
(自己最良値の80%以上) コメント: 注意ゾーン1 安全ゾーンの薬に気管支拡張薬を追加しましょう			
映入業: (15分後に症状を確認する) 内脳薬: (30分後に症状を確認する)を使いましょう。 症状が改善しても を 時間ごとに吸入/内臓する。 安全ゾーンの状態を数日間維持できたら中止する。 日間使ったら中止する。 症状が改善しなければ受診する。 一度改善しても症状をくり返すときは早めに受診する。			
一度の番しくも症状をくり返すとさば平のに受診する。 翌日かかりつけ医を受診する。 コメント:			
注意ゾーン2 注意ゾーン1の治療で症状の改善がなければ受診しましょう (国) (国) (国)			
吸入薬: (15分後に症状を確認する) 内脳薬: (30分後に症状を確認する)を使いましょう。 症状が改善したら、注意1の対応に従う。 症状が変わらないまたは悪化しているとさはすぐに受診する。 症状が変わらないまたは悪化しているとさは受診する。 症状が良くなったがまだ残っているとさは受診する。 症状が良くなったがまだ残っているとさは 時間後に を吸入/内臓する。			
- イベドロ			
きけんゾーン すぐ病院を受診しましょう			
●以下のいずれかがあてはまる ・遊べない、話せない、歩けない ・食事がほとんどとれない ・競しなない、眼れない。 ・競色が悪い(響の色や爪の色の赤みがない) ・ぼーっとしているまたは普段よりも興奮して暴れている ・遠々からても明らかにゼーゼーしていることがわかる ・息をすうときにのどやうっ骨の間などがはっきりとへこむ、小鼻が削く ・脈がとても速い ●ピークフローの値: 未満(自己最良値の30%未満)			

特記事項 年 月 作成